目錄

1. 统计学若干问 3

1. 统计学若干问

- 异常值应该如何处理？
    1. 首先检查是否有数据录入错误；
    2. 不能因为异常值比期望过高或过低而移除；
    3. 使用敏感度分析，比较异常值对结果的影响，如影响较大：
        1. 转换数据（对数、平方根等等）；
        2. 非参数检验。

- 何时需要转换数据？如何转换数据？
    1. 转换数据的目的：
        - 使数据正态分布；
        - 使两个变量呈线性关系；
        - 使方差稳定。
    2. 常见的转换方法：
        - 对数
            - 单个变量，分布右偏，取对数可接近正态分布（常见于部分生化指标）；
            - 两个变量，指数关系，因变量取对数可接近线性关系；
            - 分组数据，数值大的组方差大，取对数可使方差相似。
        - 平方根
            - 和对数转换类似（常见于发生次数少的事件数）；
            - 方差/平均值为常数时可使方差相似。
        - 倒数
            - 用于生存分析，对存活时间取倒数；
            - 方差/平均值的四次方为常数时可使方差相似。
        - 平方
            - 单个变量，分布左偏，取平方可接近正态分布；
            - 两个变量，上凸，取平方可接近线性关系；
            - 分组数据，数值小的组方差大，取平方可使方差相似。
        - Logit转换
            - $logit(p)=\ln\frac{p}{1-p}$为
            - 因变量p范围□0□1□□S型曲线，取Logit可使其线性化。

- 何时需要非参数检验？

参数检验	**非参数检验**	**需要使用非参数检验的条件**
成对t检验	Wilcoxon配对检验	差异不是正态分布
两样本t检验	Mann-Whitney U检验□Wilcoxon检验的两样本情形）	方差不等；样本数少时非正态分布也有影响
方差分析ANOVA F检验	Kruskal-Wallis检验	方差不等；严重偏离正态分布

- 如何判断数据是否正态分布？方差相等？
    1. 判断正态分布□Shapiro-Wilk检验□Kolmogorov-Smirnov检验；
    2. 判断方差相等□Levene检验□Bartlett检验；

3. Bartlett检验要求正态分布，Levene检验则没有要求。

- 如何进行相关性分析？
  1. 当散点图提示两个变量为接近线性关系时，可以计算Pearson相关系数r，r的绝对值越接近1，则相关性越强；
  2. 如果出现以下情形，则r值可能不正确：
     - 两个变量的关系不是线性（如二次函数关系）；
     - 每个个体出现一个以上的观察值；
     - 出现至少一个异常值；
     - 数据分布呈现次群组，且这些次群组至少有一个变量的平均值不同。
  3. 如果出现以下情形的一项，应该计算Spearman相关系数而不是Pearson相关系数：
     - 至少一个变量是等级数据（非连续数据）；
     - 两个变量均不是正态分布；
     - 样本数很小；
     - 两个变量不是线性关系。

- 如何确定样本量？
  1. 确定如下三个变量：
     - 效力，即1-β，一般至少80%；
     - 显著水平，即α，一般为0.05或0.01；
     - 有临床意义的平均值的最小差异δ。
  2. 计算标准化的差异，见下表，如无标准差结果则可能需要预试验；
  3. 初步计算样本量N。
     - 使用Altman计算图表，将标准化的偏差和效力连线，取得交叉点的数值，即总样本量；
     - 或者使用快速公式，即Lehr公式，用于计算效力80%、显著水平0.05的**各组**样本量，$$\frac{16}{(Standardized Difference)^{2}}$$如果效力为90%，则将分子16换乘21。如果标准化的差异小，该方法易高估。
     - 或者使用软件计算,如中提供的power.t.test等。
  4. 校正样本量
     - 除了Lehr公式外，以上计算结果N为总样本量，每组平均分配；
     - 在病人数少或药物有限等情况下，可减少一组人数而增加另一组人数；
     - 人数不平衡时，效力会下降，因此需要增加总样本数；
     - 设某组（通常为对照组）的人数是另一组（通常为实验组）的k倍，则校正后的总样本数为$$N'=\frac{N(1+k)^{2}}{4k}$$故人数少的一组有$\frac{N'}{1+k}$人，人数多的一组有$\frac{kN'}{1+k}$人。

检验方法	**标准化的差异**	**说明**
成对t检验	$\frac{2δ}{σ_{d}}$	$σ_d$为差异的标准差
非成对t检验	$\frac{δ}{σ}$	σ为两组数据假设的相等的标准差
卡方检验	$\frac{p_{1}-p_{2}}{\sqrt{\overline{p}(1-\overline{p})}}$	p_1-p_2为两组的成功比例有临床意义的最小差异

- 样本量有限时如何增加效力？
  - 收集更详细的信息，数值数据（如：血压的值）优于分类数据（如：正常血压/高血压）；
  - 进行不同形式的分析，如：参数检验比非参数检验更有效力；
  - 收集数据时减少随机误差，如：标准化、训练受试者；

- 修正研究设计。

From:
https://irdya.top/ - **漂流記**

Permanent link:
https://irdya.top/zh/misc/statfaq

Last update: **2022/05/29 12:05**